「この地図は、建設省国土地理院長の承認を得て、同院発行の2.5万分の1
地形図を複製したものである。（承認番号）昭54総複、第456号」

川崎・扇島地区潜在自然植生図

Karte der potentiellen natürlichen Vegetation des Bezirks Kawasaki und Ohgishima (an der Tokyo–Bucht)

調 査 者

宮脇　昭・藤間悳子・藤原一絵
（横浜国立大学環境科学研究センター植生学研究室）

von

Akira MIYAWAKI, Hiroko TOHMA und Kazue FUJIWARA
(Abt. Vegetationskunde d. Inst. f. Umweltwiss.,
Staatl. Universität Yokohama / Japan)

縮　尺　Maßstab　1:20 000

0　500　1000　1500　2000m

Zustand im 1978

位 置 図　ORIENTIERUNGSKARTE



凡　例　Legende

1 マサキ－トベラ群集
Euonymo－Pittosporetum tobirae

2 イノデ－タブ群集
Polysticho－Machiletum thunbergii

3 ゴマギ－ハンノキ群集
Viburno sieboldii－Alnetum japonicae

4 オギ－ヨシ群団
Miscantho sacchariflori－Phragmition

5 ウラギククラス（塩沼地植生）
Asteretea tripolium (Salzwiesengesellschaften)

6 ヒルムシロクラス（開放水域植物群落）
Potamogetonetea (Offeneswassergesellschaften)

7 ハマボウフウクラス
Glehnietea littoralis

8 チガヤ群落
Imperta cylindrica var. *koenigii*–Gesellschaft

9 開放水域
Offenes Wasser

備　考

1979年末までの経年追加現地調査の結果，立地の安定化が進み，表土を復元した場合に大部分
▨ の地区はイノデータブ群集が潜在自然植生として支持可能と判定される。
□ 海域周辺部はマサキートベラ群集と判定される。

Anmerkung: Nach fortdauernden Untersuchungen im Gelände bis Ende 1979 war die Stabilisierung der Standorte, besonders Boden– und Wasserzustand, fortgeschritten; Wenn Mutterboden aufgebracht wird,
▨ ist die Erhaltung des Polysticho–Machiletum thunbergii
als Potentille natürliche Vegetation möglich.
□ wird sich am Meeresrand ein Euonymo–Pittosporetum tobirae entwickeln.

国土地図株式会社