

Tab. 3. *Euonymo-Pittosporretum tobirae*
マサキトベラ群集

Nr. d. Aufnahme :	調査番号	1	2
Datum d. Aufnahme (1972) :	調査月日	V	XI
		14	24
Exposition :	方位	- WSW	
Neigung (°) :	傾斜	30	40
Größe d. Probestfläche (m ²) :	調査面積	70	100
Höhe d. Baumschicht (m) :	高木層の高さ	10	6
Deckung d. Baumschicht (%) :	高木層植被率	20	90
Höhe d. Strauchschicht (m) :	低木層の高さ	25	1.7
Deckung d. Strauchschicht (%) :	低木層植被率	90	30
Höhe d. Krautschicht (m) :	草本層の高さ	0.3	0.5
Deckung d. Krautschicht (%) :	草本層植被率	5	10
Artenzahl :	出現種数	14	20
<hr/>			
<u>Kenn- und Trennarten d. Ass.:</u>	群集標徴種および区分種		
<i>Euonymus japonicus</i>	マサキ	S	4.4 1.2
		K	+ +
<i>Pittosporum tobira</i>	トベラ	B	. 2.2
		S	2.3 1.1
		K	. +
<i>Elaeagnus macrophylla</i>	マルバグミ	S	+ +.2
<i>Pinus thunbergii</i>	クロマツ	B	2.2 .
<i>Daphniphyllum teijsmannii</i>	ヒメユズリハ	B	. 2.3
<i>Cyrtomium falcatum</i>	オニヤブソテツ	K	. +.2
<i>Farfugium japonicum</i>	ツワブキ	K	. +
<u>Kenn- und Trennarten d. Verb. und Ord. :</u>	群集, オーダー標徴種および区分種		
<i>Ilex integra</i>	モチノキ	B	. 1.1
		S	1.2 .
<i>Neolitsea sericea</i>	シロダモ	S	+ +
<i>Machilus thunbergii</i>	タブノキ	B	. 2.2
		S	+ +.2
<i>Trachycarpus fortunei</i>	シュロ	K	+ .
<i>Cinnamomum japonicum</i>	ヤブニッケイ	B	. 2.2
<i>Dendropanax trifidus</i>	カクレミノ	S	. +
<i>Piper kadsura</i>	フウトウカズラ	K	. +.2
<i>Hedera rhombea</i>	キヅタ	K	. +
<i>Ophiopogon planiscapus</i>	オオバジャノヒゲ	K	. +
<u>Kennarten d. Klasse :</u>	クラス標徴種		
<i>Camellia japonica</i>	ヤブツバキ	B	. 3.3
		S	. +
<i>Eurya japonica</i>	ヒサカキ	B	. 2.2
		S	. +.2
<i>Aucuba japonica</i>	アオキ	S	. 1.1

Begleiter 随伴種 : in Aufn. Nr. 1: *Rhus javanica* ヌルデ S-+, *Celtis sinensis* var. *japonica* エノキ S-+, *Celastrus orbiculatus* ツルウメモドキ S-+, *Ligustrum obtusifolium* イボタノキ S-+.2, *Rubia akane* アカネ K-+, *Akebia quinata* アケビ K-+, in 2: *Smilax china* サルトリイバラ K-+, *Carex breviculmis* var. *fibrillosa* ハマアオスゲ K-+, *Polystichum polyblepharum* var. *intermedium* アイアスカイノデ K-+.

Fundorte 調査地 : 1: Narashino I.C. 習志野インターチェンジ, 2: Hachiman-misaki 八幡岬.

Tab. 10. *Phyllostachys heterocyclus* var. *pubescens*-Bestand

モウソウチク林

Nr. d. Aufnahme :	調査番号	1	2	3	4
Datum d. Aufnahme :	調査月日	'72	'71	'72	'71
		IV	VIII	V	VI
		27	25	12	28
Größe d. Probefläche (m ²) :	調査面積	100	100	85	100
Exp. u. Neigung (°) :	方位と傾斜			SE	
		L	L	25	L
Höhe d. Baumschicht (m) :	高木層の高さ	7	8	9	8
Deckung d. Baumschicht (%) :	高木層植被率	80	90	80	90
Höhe d. Strauchschicht (m) :	低木層の高さ	2	3	4	2
Deckung d. Strauchschicht (%) :	低木層植被率	10	20	5	5
Höhe d. Krautschicht (m) :	草本層の高さ	0.3	0.5	0.6	0.5
Deckung d. Krautschicht (%) :	草本層植被率	60	50	10	80
Artenzahl :	出現種数	23	30	33	30
<u>Gepflanzte Baum :</u>	植栽樹種				
<i>Phyllostachys heterocyclus</i> var. <i>pubescens</i>	モウソウチク	B	5.4	5.4	5.5
		S	1.1	1.2	.
<u>Zeigerarten d. feuchten Standortes :</u>	湿生地指標種群				
<i>Aphananthe aspera</i>	ムクノキ	B	.	1.2	.
		S	+	+	1.2
<i>Houttuynia cordata</i>	ドクダミ	K	+2	.	+
<i>Athyrium niponicum</i>	イヌワラビ	K	1.2	+2	+
<i>Polygonum filiforme</i>	ミズヒキ	K	+2	+	.
<i>Disporum sessile</i>	ホウチャクソウ	K	.	+	+
<i>Celtis sinensis</i> var. <i>japonica</i>	エノキ	S	+	+	.
<i>Zelkova serrata</i>	ケヤキ	B	.	.	2.2
		S	.	+	+
<u>Arten d. Camellietea japonicae :</u>	ヤブツバキクラスの種				
<i>Trachycarpus fortunei</i>	シュロ	S	+	1.1	+
		K	.	+	.
<i>Hedera rhombea</i>	キツタ	S	.	+	.
		K	+	3.4	+
<i>Ophiopogon japonicus</i>	ジャノヒゲ	K	+	+	+
<i>Aucuba japonica</i>	アオキ	S	.	+	+
<i>Ardisia japonica</i>	ヤブコウジ	K	.	1.2	+
<i>Liriope platyphylla</i>	ヤブラン	K	.	+	+
<i>Thea sinensis</i>	チャノキ	S	.	+	+
<i>Neolitsea sericea</i>	シロダモ	B	.	1.2	+
		S	.	1.2	+
<i>Camellia sasanqua</i>	サザンカ	S	+	.	.
<i>Quercus glauca</i>	アラカシ	S	.	.	+
<i>Quercus myrsinaefolia</i>	シラカシ	S	.	.	+
<i>Cephalotaxus harringtonia</i>	イヌガヤ	S	.	.	+
<i>Castanopsis cuspidata</i> var. <i>sieboldii</i>	スタジイ	S	.	.	+
<i>Nandina domestica</i>	ナンテン	K	.	.	+
<i>Ardisia crenata</i>	マンリョウ	K	.	.	+
<i>Trachelospermum asiaticum</i>	テイカカズラ	K	.	.	+
<i>Dryopteris erythrosora</i>	ベニシダ	K	.	.	+
<u>Begleiter :</u>	随伴種				
<i>Oplismenus undulatifolius</i> var. <i>japonicus</i>	チヂミザサ	K	3.3	2.2	+2
<i>Akebia quinata</i>	アケビ	K	.	+	+
<i>Hemerocallis fulva</i> var. <i>kwanso</i>	ヤブガンゾウ	K	+	.	+
<i>Stellaria aquatica</i>	ウシハコベ	K	+2	.	.
<i>Prunus grayana</i>	ウワミズザクラ	S	.	+	+
<i>Carpinus tschonoskii</i>	イヌシデ	S	.	+	+
<i>Acanthopanax sieboldianus</i>	ウコギ	S	.	+	+
<i>Wisteria floribunda</i>	フジ	S	.	.	+
		K	.	.	.
<i>Callicarpa japonica</i>	ムラサキシキブ	S	.	.	+
<i>Commelina communis</i>	ツユクサ	K	1.2	.	.
<i>Achyranthes japonica</i>	イノコズチ	K	+2	.	.
<i>Cayratia japonica</i>	ヤブカラシ	K	+	.	.

出現一回の種 Außerdem je einmal in Aufn. Nr. 1: *Athyrium japonicum* シケンダ K-+, *Paederia scandens* var. *mairei* ヘクソカズラ K-+2, *Circaea mollis* ミズタマソウ K-+, *Ampelopsis brevipedunculata* ノブドウ K-+, *Rosa multiflora* ノイバラ K-+, *Boehmeria nipononivea* var. *concolor* アオカラムシ K-+, *Amaranthus lividus* イヌビユ K-+, in 2: *Zanthoxylum schinifolium* イヌザンショウ S-1.1, *Magnolia obovata* ホオノキ S-+, *Lindera glauca* ヤマコウバシ S-+, *Euscaphis japonica* ゴンズイ S-+, *Gynostemma pentaphyllum* アマチャヅル K-+, *Lonicera japonica* スイカズラ K-+, *Fatoua villosa* クワクサ K-+, *Desmodium oxyphyllum* var. *mandshuricum* ヤブハギ K-+, *Viburnum dilatatum* ガマズミ K-+, *Fraxinus lanuginosa* コバノトネリコ K-+, in 3: *Akebia trifoliata* ミツバアケビ K-+, *Euonymus oxyphyllus* ツリバナ S-+, *Zanthoxylum piperitum* サンショウ S-+, in 4: *Lactuca raddeana* var. *elata* ヤマニガナ K-+, *Petasites japonicus* フキ K-1.2, *Brachypodium sylvaticum* ヤマカモジグサ K-+2, *Cryptotaenia japonica* ミツバ K-+, *Arundinaria chino* アズマネザサ K-+, *Dioscorea tokoro* トコロ K-+, *Polygonum caespitosum* var. *laxiflorum* ハナタデ K-+2, *Phryma leptostachya* ハエドクソウ K-1.2, *Festuca parvigluma* トボシガラ K-+2, *Galium spurium* f. *strigosum* ヤエムグラ *Eupatorium chinense* var. *simplicifolium* ヒヨドリバナ K-+, *Pollia japonica* ヤブミョウガ K-+, *Sedum lineare* オノマンネングサ K-+.

Tab. 11. *Arundinario chino*-*Miscanthetum sinensis* und *Campanula punctata*-*Brachypodium sylvaticum*-Gesellschaft

アズマネザサーススキ群集およびホタルブクロ-ヤマカモジグサ群落

A: *Arundinario chino*-*Miscanthetum sinensis*

アズマネザサーススキ群集

1: Typische Subass. 典型亜群集

2: Subass. von *Geranium krameri*

タチフウロ亜群集

B: *Campanula punctata*-*Brachypodium sylvaticum*-Gesellschaft

ホタルブクロ-ヤマカモジグサ群落

		A		B
		1 + 2		
		1	2	3
Aufnahmenummer :	調査地番号	1	2	3
Zahl d. Aufnahmen :	調査区数	3	2	2
Mittlere Artenzahl :	平均種数	22	28	26
Kenn- u. Trennarten d. Ass. (A) :	群集(A)標徴種および区分種			
<i>Miscanthus sinensis</i>	ススキ	3 ₅₋₃	2 ₄	1+
<i>Arundinella hirta</i>	トダシバ	3 ₂₋₊	2 ₂₋₊	.
<i>Artemisia japonica</i>	オトコヨモギ	2 ₁₋₊	2 ₁₋₊	.
<i>Arundinaria chino</i>	アズマネザサ	2 ₂₋₁	2 ₂₋₁	1 ₂
<i>Rosa multiflora</i>	ノイバラ	1+	2+	.
<i>Pteridium aquilinum</i> var. <i>latiusculum</i>	ワラビ	1+	2+	.
<i>Desmodium oxyphyllum</i>	スズビトハギ	2+	1+	.
Trennarten d. Subass. (A-2) :	亜群集 (A-2) 区分種			
<i>Sanguisorba officinalis</i>	ワレモコウ	.	2 ₁₋₊	.
<i>Geranium krameri</i>	タチフウロ	.	2 ₁₋₊	.
<i>Thalictrum kemense</i> var. <i>hypoleucum</i>	アキカラマツ	.	2 ₁₋₊	.
<i>Desmodium fallax</i>	ヤブハギ	.	2+	.
<i>Cirsium tanakae</i>	ノハラアザミ	.	2+	.
<i>Chrysanthemum makinoi</i>	リュウノウギク	.	2 ₁₋₊	2 ₂₋₊
<i>Seseli libanotis</i> var. <i>japonica</i>	イブキボウフウ	.	2+	1+
<i>Gentiana scabra</i> var. <i>buergeri</i>	リンドウ	.	2+	1+
<i>Euphorbia pekinensis</i>	タカトウダイ	.	2+	1+
<i>Rubus parvifolius</i>	ナワシロイチゴ	.	2+	1+
<i>Wisteria floribunda</i>	フジ	.	2+	1+
Trennarten d. Gesellschaft (B) :	群集(B)区分種			
<i>Campanula punctata</i>	ホタルブクロ	.	.	2 ₃₋₁
<i>Brachypodium sylvaticum</i>	ヤマカモジグサ	.	.	2 ₃₋₊
<i>Youngia denticulata</i>	ヤクシソウ	.	.	2+
<i>Youngia japonica</i>	オニタビラコ	.	.	2+
Kenn- u. Trennarten d. Verb., Ord. u. Klasse :	群団, オーダーおよびクラス標徴種と区分種			
<i>Cirsium japonicum</i>	ノアザミ	3+	1+	1+
<i>Aster ageratoides</i> var. <i>ovatus</i>	ノコンギク	3 ₁₋₊	1+	1+
<i>Lespedeza pilosa</i>	ネコハギ	1+	2+	1+
<i>Indigofera pseudo-tinctoria</i>	コマツナギ	1+	2+	1+
<i>Potentilla freyniana</i>	ミツバツチグリ	1+	1+	.
<i>Solidago virga-aurea</i> var. <i>asiatica</i>	アキノキリンソウ	2+	.	.
<i>Vicia unijuga</i>	ナンテンハギ	1+	.	1+
<i>Petasites japonicus</i>	フキ	1+	.	1+
Begleiter :	随伴種			
<i>Deutzia crenata</i>	ウツギ	2+	2+	.
<i>Paederia scandens</i> var. <i>mairei</i>	ヘクソカズラ	2+	2+	.
<i>Quercus serrata</i>	コナラ	1+	2 ₂	.
<i>Vitis ficifolia</i> var. <i>lobata</i>	エビヅル	2 ₁₋₊	2+	.
<i>Pinus densiflora</i>	アカマツ	1+	1+	1+
<i>Smilax china</i>	サルトリイバラ	1+	2+	.
<i>Carex lanceolata</i>	ヒカゲスゲ	1+	2+	.
<i>Solidago altissima</i>	セイタカアワダチソウ	2 ₁₋₊	.	1+
<i>Houttuynia cordata</i>	ドクダミ	2 ₁₋	.	1+
<i>Rubia akane</i>	アカネ	1+	1+	1+
<i>Hydrocotyle ramiflora</i>	オオチドメ	1+	1+	.
<i>Castanea crenata</i>	クリ	1+	2+	.
<i>Spiraea japonica</i>	シモツケ	1+	1+	.
<i>Amphicarpaea trisperma</i>	ヤブマメ	.	1+	1 ₁
<i>Carpinus tshonoskii</i>	イヌシデ	1 ₁	1+	.
<i>Osmunda japonica</i>	ゼンマイ	1+	.	1 ₁
<i>Lonicera japonica</i>	スイカズラ	1+	1+	.
<i>Equisetum arvense</i>	スギナ	2 ₁₋₊	.	1+
<i>Erigeron annuus</i>	ヒメジョオン	1 ₁	.	1+
<i>Pueraria lobata</i>	クズ	1+	.	1 ₁
<i>Artemisia princeps</i>	ヨモギ	1+	.	1+
<i>Dioscorea tokoro</i>	トコロ	2+	.	.
<i>Picris hieracioides</i> var. <i>glabrescens</i>	コウゾリナ	1+	.	1+